

Chestionarul O'Leary / Sant

Scorul durerii și al tulburărilor micționale în Cistita Interstițială (CI)

Scorul simptomelor cistitei interstițiale

1. În ultima lună, cât de des ați simțit nevoia urgentă de a urina, fără posibilitatea de a amîna ?

- 0. deloc
- 1. mai puțin de o dată din 5 situații
- 2. mai puțin de jumătate din situații
- 3. în jumătate din situații
- 4. mai mult de jumătate din situații
- 5. aproape întotdeauna

2. În ultima lună ați fost nevoit să urinați din nou, la mai puțin de 2 ore, după urinarea precedentă ?

- 0. deloc
- 1. mai puțin de o dată din 5 situații
- 2. mai puțin de jumătate din situații
- 3. jumătate din situații
- 4. mai mult de jumătate din situații
- 5. aproape întotdeauna

3. În ultima lună, cât de des v-ați trezit noaptea ca să urinați ?

- 0. niciodată
- 1. o dată pe noapte
- 2. de 2 ori pe noapte
- 3. de 3 ori pe noapte
- 4. de 4 ori pe noapte
- 5. de mai mult de 5 ori

4. În ultima lună, cât de des ați simțit durere sau arsuri în vezica urinară ?

- 0. deloc
- 1. o dată
- 2. de cîteva ori
- 3. destul de des
- 4. aproape întotdeauna
- 5. continuu

Aduņa cifrele pe care le-ați încercuit =

Scorul afectării în cistita interstițială

Apreciați în ce măsură, situațiile următoare, au constituit o problemă pentru dumneavoastră, în ultima lună:

1. Urinarea frecventă în timpul zilei:

- 0. nici o problemă
- 1. o foarte mică problemă
- 2. o mică problemă
- 3. o problemă moderată
- 4. o problemă mare

2. Trezirea noaptea pentru a urina:

- 0. nici o problemă
- 1. o foarte mică problemă
- 2. o mică problemă
- 3. o problemă moderată
- 4. o problemă mare

3. Senzația bruscă de a urina, care nu poate fi amînată:

- 0. nici o problemă
- 1. o foarte mică problemă
- 2. o mică problemă
- 3. o problemă moderată
- 4. o problemă mare

4. Arsurile, durerea, disconfortul sau presiunea în vezica urinară:

- 0. nici o problemă
- 1. o foarte mică problemă
- 2. o mică problemă
- 3. o problemă moderată
- 4. o problemă mare

Aduņa cifrele pe care le-ați încercuit =

Scor > 7 are sensibilitate de 100 % în depistarea CI la pacienții cu simptome urologice
Cel mai bun raport sensibilitate/specificitate (86% / 65%) este la un scor mai mare de 12.